



Phencyclidine (PCP)

Description

- **Catégorie** : perturbateur du système nerveux central
- **Synonymes** : peace pill, mess, th, angel dust, éléphant, cristal, rocket fuel
- **Présentation** : poudre blanche, capsule, comprimé
- **Mode de consommation** : voie orale, priseée (sniffée), fumée ou injectée

Effets recherchés

- Distorsion de la perception du temps, de l'espace et du corps
- Dissociation de l'environnement
- Euphorie
- Hallucinations visuelles et auditives
- Réduction de la perception de la douleur et de l'environnement
- Relaxation
- Sensation de légèreté et de flottement
- Sentiment d'irréalité
- Stimulation plaisante

Effets déplorables et risques

- Amnésie
- Altération du jugement
- Anxiété, agitation et crise de panique
- Comportements inadaptés, bizarres, impulsifs, hostiles ou violents
- Confusion
- Désorientation, désorganisation de la pensée
- Difficulté d'attention, de concentration et de réflexion
- Étourdissements
- Engourdissements des extrémités
- Hypersensibilité à la lumière, au son et à la douleur
- Langage incohérent
- Mouvements involontaires et saccadés des yeux
- Regard fixe
- Troubles de la mémoire
- Troubles psychomoteurs et incoordination des mouvements
- Psychose aiguë : sentiment intense d'aliénation, épisode psychotique latent, psychose toxique, hallucinations, délire et troubles paranoïdes.
- Surdose : délire, rigidité musculaire, mutisme, sédation sévère, stupeur, convulsions, coma, arrêt cardiaque ou respiratoire, complications rénales, hémorragies cérébrales, mort.

Attention

Le PCP est très toxique : l'écart entre la dose qui provoque un effet psychédélique agréable et la dose où la personne perd le contrôle est très faible. L'intoxication chronique entraîne de l'isolement, des comportements bizarres, imprévisibles et violents, des problèmes cérébraux, psychologiques et psychiatriques. Beaucoup de décès liés à l'usage du PCP sont dus à des accidents, des suicides ou des homicides. La consommation régulière de PCP peut entraîner une tolérance (besoin d'en prendre plus pour obtenir le même effet). La dépendance psychologique s'observe chez quelques consommateurs réguliers. L'injection entraîne des risques d'infections, notamment par le virus du SIDA, l'hépatite B et C si l'utilisateur n'utilise pas un matériel d'injection stérile à usage unique.

Si tu consommes du PCP...

- Procure-toi ta consommation auprès d'une personne fiable; ce qui est vendu en tant que PCP est habituellement de la mescaline et peut contenir d'autres substances toxiques qui ne te conviennent pas.
- Commence par de petites quantités pour évaluer la qualité, la puissance et éviter une surdose.
- Évite de partager le matériel de consommation (paille, seringue, cuillère), car cela peut transmettre l'hépatite B, C et le VIH. Rince tes narines avec de l'eau pour minimiser les dommages à la muqueuse du nez.
- Évite les mélanges : ils sont plus risqués avec d'autres perturbateurs tels le cannabis et l'alcool (imprévisibilité des résultats et amplification des effets).
- Reporte les tâches et activités complexes ou risquées et laisse quelqu'un de sobre conduire à ta place.